

# 目薬

# お試し パック



製造番号

使用期限



この説明書は、お薬とともに保管し、使用の際にはよくお読みください。

目の乾き、コンタクトレンズ装着時の不快感に

人工涙液型点眼剤 **第3類医薬品**

# ソフトサンティア®

## Soft Santear

# 涙に近い性質で 乾いた瞳を やさしく うるおす目薬。

コンタクト  
したまま  
OK!



5mL×2本入

ひとみ・すこやか

⚠ 開栓後、約10日間以上すぎた使い残りの薬液は使用しないでください。

※容器ラベルに開栓日記入欄がありますのでご利用ください。

### 相談すること

### 使用上の注意

- 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること  
 (1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 次の症状のある人：はげしい目の痛み (4) 次の診断を受けた人：緑内障
- 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること  
 皮ふに発疹・発赤、かゆみ / 目に充血、かゆみ、はれ
- 3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること  
 (1) 目のかすみが改善されない場合 (2) 2週間くらい使用しても症状がよくならない場合

【用法・用量】 1回 2～3滴、1日 5～6回点眼する。

● 次の注意事項を守ること (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(2) 容器の先を、目やまぶた、まつ毛に触れさせないこと。また、混濁したものは使用しないこと。(3) 点眼用のみ使用すること。

【効能・効果】 ハードコンタクトレンズまたはソフトコンタクトレンズを装着しているときの不快感、涙液の補助(目のかわき)、目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

【有効成分】 塩化カリウム 0.1%、塩化ナトリウム 0.4%


【添加物】 ホウ酸、pH 調節剤

【保管および取扱い上の注意】 (1) 使用するまでは、キャップをねじ込まないこと。(2) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。製品の品質を保持するため、自動車の中や暖房器具の近くなど高温となる場所に放置しないこと。また、高温となる場所に放置したものは、容器が変形して薬液が漏れたり薬液の品質が劣化しているおそれがあるため、使用しないこと。(3) 小児の手の届かない所に保管すること。(4) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある。) (5) 他の人と共用しないこと。(6) 使用期限をすぎた製品は使用しないこと。また、使用期限内であっても、開栓後、約10日間以上すぎた使い残りの薬液は使用しないこと。(7) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側に白くつくことがある。その場合には清潔なガーゼで軽くふき取って使用すること。

### 開栓方法

本剤は、はじめ、点眼口にアナがはさまっていません。ご使用前に、キャップをねじ込み、アナをあけてください。

※使用するまでは、キャップをねじ込まないでください。



キャップを容器の肩にとどく程度にまわすと図のように、点眼口にアナがあき、点眼できる状態になります。

お問い合わせ先

商品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

参天製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0120-127-023 (土・日・祝日を除く9:00~17:00)

お問い合わせ内容の正確性を期すため、また回答の質の維持・向上のため、お電話を録音させていただいております。

【副作用被害救済制度の問い合わせ先】 電話 0120-149-931

製造販売元

参天製薬株式会社

大阪市北区大深町4-20

www.santen.co.jp



フィルム:PS  
外装:PE,PET