

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

目のかわき・疲れ・かすみに

アイビット目薬CL

コンタクトレンズ対応涙液型目薬

アイビット目薬CLの特長

- すべてのコンタクトレンズ（ハード・ソフト・O₂・使い捨てレンズ）を装着したままでも安心してご使用頂けます。
- コンタクトレンズ装着時の乾燥感や、長時間のテレビ、読書、パソコン、車の運転などの目の酷使による目の疲れ、目のかすみ、ゴロゴロした不快感などには、なみだのはたらきが重要な役割を果たしています。

[アイビット目薬CLは「ヒプロメロース」配合の涙液型目薬なので、目の疲れ・かすみ等を改善し、とりりとした薬液が目のおいさを長持ちさせます]。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人。
緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 目のかすみが改善されない場合。
- (2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合。

効能・効果


目の疲れ、涙液の補助（目のかわき）、ハードコンタクトレンズ又はソフトコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ(目やにの多いときなど)

用法・用量

1日5～6回、1回2～3滴点眼してください。

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先を、まぶた、まつ毛に触れさせないでください〔汚染や異物（目やにやほこり等）混入の原因となります〕。また、混濁したものを使用しないでください。
- (3) 点眼用にのみ使用してください。
- (4) コンタクトレンズを装着していないときでも使用できます。
- (5) 用法・用量を厳守してください。



有効成分（100mL中）


ヒプロメロース……………300mg

塩化ナトリウム……………516mg

添加物としてデキストラン70、ホウ酸、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、D-マンニトール、エデト酸ナトリウム水和物、塩化ポリドロニウム、水酸化ナトリウムを含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く使用してください。
- (6) 保管状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側に付くことがあります。その場合には、清潔なガーゼで軽くふき取ってください。



※潤いを持続させるため、薬液に粘性をもたせております。そのため、点眼後、しばらく視野がぼやけることがあるのでご注意ください。

お客様相談係

電話番号：076 (431) 8863 [テイカ製薬(株)]

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

包 装 15mL

おねがい

品質を保持するため高温になる所に置かないでください。

自動車の車内や暖房器具の近くなど、高温になる場所に放置すると容器が変形したり、薬液の品質が劣化することがあります。



発 売 元 **日本薬剤株式会社**

富山市東中野町一丁目1番1号

製造販売元 **テイカ製薬株式会社**

富山市荒川一丁目3番27号