

コンタクトレンズ装着時の不快感に。ドライアイ(目のかわき)、目のつかれに。

ソフトでもハードでもOK!!


ティアレCL[®]

〈人工涙液〉

ティアレCL[®] 3つの特長

1 どのコンタクトレンズ
でもつけたまま
点眼!

レンズをいためる成分が入っていないので、O₂・ハードコンタクトレンズはもちろん、ソフトコンタクトレンズや使い捨てコンタクトレンズを装着したままでも点眼できます。



2 防腐剤無添加!

多くの目薬には、防腐剤が入っています。これは、細菌や雑菌が繁殖するのを防ぐためです。ティアレCLは使用時に開封するため、防腐剤を含まなくても細菌が繁殖することはありません。

3 1本ずつ
無菌充てん!

ティアレCLは1本ずつを無菌充てんした1回使いきりタイプ。自然の涙に近い成分で目にやさしい目薬です。



⚠ 使用上の注意



相談すること

★ 1 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人または家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の症状のある人
 - ・ はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人
 - ・ 緑内障

★ 2 次の場合は直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合
- (2) 目のかすみ改善されない場合
- (3) 2週間くらい使用しても症状がよくならない場合


関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

効能・効果 目の疲れ、涙液の補助（目のかわき）、ハードコンタクトレンズまたはソフトコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ（目やにの多いときなど）

用法・用量 1日3～6回、1回2～3滴を点眼する。

○次の注意事項をお守りください。

- (1) 小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとで使用させてください。
- (2) キャップ部分を軽く引っ張りながら、ゆっくりまわして開けてください。
（勢よく開封すると、薬液が飛び散る場合があります。）
- (3) 混濁したものは使用しないでください。
- (4) 点眼用にのみ使用してください。



成分・分量 0.5mL×30本
塩化ナトリウム 0.74%、塩化カリウム 0.13%
添加物としてリン酸二水素Na、リン酸水素2Na、ポビドン、ヒプロメロース、pH調整剤を含有する。

保管および取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 薬液を他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり、品質が変わったりする恐れがあります。）
- (4) 1本を他の人と共用しないでください。
- (5) 使用後に薬液が残っていても、再使用しないでください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、一度内袋を開封した後は速やかに使用してください。
- (7) 本剤を携帯する際、ズボンの後ろのポケット等に入れてください。（キャップ部分が折れて開いてしまう恐れがあります。）

