

使用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

人工涙液型点眼剤

# アイリスCL 第3類医薬品

〈目薬〉

- ◆アイリスCLは、涙液に近い性質を持った人工涙液で、涙液不足にともなう目のかわき(ドライアイ)を改善します。
- ◆アイリスCLは、すべてのタイプのコンタクトレンズ[ソフト・O<sub>2</sub>・ハード・ディスポザブル(使い捨て)]を装着したまま点眼することができ、コンタクトレンズ装用時の不快感、目のつかれ、目のかすみ、目のかわきなどの諸症状を改善します。

## 使用上の注意

### 相談すること

- ① 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (4) 次の症状のある人。  
はげしい目の痛み
  - (5) 次の診断を受けた人。  
緑内障
- ② 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
  - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

  - (2) 目のかすみが改善されない場合。
  - (3) 2週間位使用しても症状がよくなる場合。

## 効 能

ハードコンタクトレンズまたはソフトコンタクトレンズを装着しているときの不快感、涙液の補助(目のかわき)、目のつかれ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

## 用法・用量

1回1～3滴、1日3～6回点眼してください。

[注意]

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛にふれさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) 点眼用にのみ使用してください。

成分、保管及び取扱い上の注意については、裏面をよくご覧ください。

[21]

## 点眼方法

- (1) 点眼する前に、手指を清潔にしてください。
- (2) キャップを回してはずしてください。
- (3) 容器の“凹み(通気口)部分”を図のように指でふさいで、胴体部を押して点眼します。凹み(通気口)部分は片側中央に1カ所あります。



- (4) 従来の点眼容器にくらべて、容器を押す力が少し必要になります。また、はじめの1滴が出てくるまでに少し時間がかかります。

※キャップをはずしたとき、容器を立てた状態で胴体部を押さないでください。  
(その後に点眼する場合、点眼しにくくなる場合があります)

※滴下しにくくても、ノズルの穴から針状のもので突かないでください。

※この目薬は、はじめから大きめの容器に入っていますので、薬液が少なく見えます。なお、この容器は二層容器となっています。使用により内側の容器は縮みませんが、異常ではありません。

## 成 分

成 分	分量	はたらき
塩化ナトリウム	0.4%	涙の成分であり、涙不足をおぎない、
塩化カリウム	0.1%	目にうるおいを与えます。

添加物：ホウ酸、ホウ砂

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 車のダッシュボード等高温下に放置しないでください。(容器の変形や薬液の品質が劣化することがあります)
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は4週間以内に使用してください。(品質保持のため)
- (7) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側に白くつくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽く拭き取って使用してください。



## 目薬をさす時の注意と正しいさし方

### 注 意

- 容器の先がまぶたやまつ毛にふれると、目やにや雑菌等のため、薬液が汚染又は混濁することがありますので注意してください。

### 正しいさし方

- 手をよく洗い、目に直接指がふれないようにしてください。
- やや上を向いて指で下まぶたをさげ、まぶたの裏側にしずくを落としてください。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いいたします。



連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室  
電 話 03-3985-1800  
受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)

発売元  
**大正製薬株式会社**  
東京都豊島区高田3丁目24番1号  
<http://www.taisho.co.jp>  
製造販売元  
**株式会社日本点眼薬研究所**  
名古屋市南区西桜町76番地

## 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)