



使用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

第2類医薬品

アレルギー用点眼薬

花粉、ハウスダスト等による目のアレルギー症状に

ひとみにやさしい

# ファインティア®PF点眼液AL 目薬

クロモグリク酸ナトリウム配合

- 抗アレルギー剤「クロモグリク酸ナトリウム」を配合したアレルギー専用点眼液です。
- 防腐剤を含んでいませんので、目にやさしく、アレルギー症状を改善します。
- クロモグリク酸ナトリウムが肥満細胞膜を安定化し、目のかゆみ・目の充血等のアレルギー症状を引き起こす誘発物質（ヒスタミン等）の放出を抑制します。  
また、抗ヒスタミン剤「クロルフェニラミンマレイン酸塩」がヒスタミンの受容体結合をブロックし、すでに起きてしまった症状を緩和します。
- 花粉、ハウスダスト等による目のかゆみ、充血、なみだ目といったアレルギーによる不快症状に効果を発揮します。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）  
点鼻薬と併用する場合には、使用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください。  
（眠気があらわれることがあります）



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (3) 次の症状のある人：はげしい目の痛み
  - (4) 次の診断を受けた人：緑内障
  - (5) 減感作療法など、アレルギーの治療を受けている人
  - (6) 妊婦または妊娠していると思われる人
  - (7) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人  
特に次のような場合には、アレルギーによるものとは断定できないため、使用前に医師にご相談ください。
    - 片方の目だけに症状がある場合
    - 目の症状のみで、鼻には症状がみられない場合
    - 視力にも影響がある場合
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、痛み

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
アナフィラキシー様症状	使用後すぐに息苦しさ、浮腫（咽喉、まぶた、鼻粘膜、口唇等）、じんましん等の症状があらわれる。

3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師または薬剤師に相談してください。
  - (1) 目のかすみ改善されない場合
  - (2) 2日間使用しても症状がよくならない場合
4. 症状の改善がみられても2週間を超えて使用する場合は、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

## 効能・効果

花粉、ハウスダスト(室内塵)等による次のような目のアレルギー症状の緩和：目のかゆみ、目の充血、目のかすみ(目やにの多いとき等)、なみだ目、異物感(コロコロする感じ)

## 用法・用量

1回1~2滴、1日4~6回点眼してください。


2日間使用しても症状の改善がみられない場合には、医師または薬剤師にご相談ください。

### 用法及び用量に関する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 点眼用에만使用してください。
- (5) 定められた用法・用量を厳守してください。

## 点眼方法

- (1) 使用する前に手指を良く洗い、目に直接指が触れないようにしてください。
- (2) 容器の黄色のマーク部分を図のように親指で押えて、ゆっくり押ししてください。  
普通の点眼瓶に比べ、強めに押ししてください。また、はじめの1滴が出てくるまで、少し時間がかかります。黄色のマーク部分は胴体中央に1ヶ所あります。
- (3) やや上を向いて指で下まぶたをさげ、目に確実にしずくを落としてください。
- (4) 点眼した後はしばらく目を閉じるか、目がしら(鼻に近い方)を軽く押えてください。  
(お薬が長く目にとどまり、効果がしっかり発揮されます)



## 成分・分量

成分	分量	はたらき
クロモグリク酸ナトリウム	1%	アレルギーの原因となる化学伝達物質の放出を抑制します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.015%	抗ヒスタミン作用により、アレルギー症状の目のかゆみ・充血を緩和します。

添加物：ホウ酸、pH調節剤

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 車のダッシュボード等高温下に放置しないでください。(容器の変形や薬液の品質が悪化することがあります)
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は4週間以内に使用してください。(品質保持のため)
- (7) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側に白くつくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽く拭き取って使用してください。

包装 7mL

【自然環境に配慮しています。携帯袋は添付しておりませんので、ご理解のほどお願い申し上げます。】

## お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

お客様サポートデスク(土、日、祝日を除く9:00~17:00)  
株式会社日本点眼薬研究所  
〒457-0038 名古屋市南区桜本町40番地の2  
TEL 052-823-9110

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

TEL 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元

 株式会社 日本点眼薬研究所  
名古屋市南区西桜町76番地