

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管しておいてください。

第2類医薬品

小児鼻炎薬

チルデント[®]こども用鼻炎シロップ

- チルデントこども用鼻炎シロップは急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎によるくしゃみ、鼻みず、鼻づまりなどの諸症状を緩和するお薬です。
- アレルギー症状をおさえる抗ヒスタミン剤「クロールフェニラミンマレイン酸塩」と鼻づまり症状を緩和する血管収縮作用のある「dL-メチルエフェドリン塩酸塩」を配合したお薬です。
- 配合生薬の「カンゾウエキス・サイシン流エキス」もアレルギー性鼻炎にやさしく作用し、お子様の不快な症状を緩和する甘くて飲みやすいイチゴ風味のシロップ剤です。
- ノンカフェイン処方です眠りを妨げず、お子様には簡単に開けられない誤飲などを防止する安全キャップを採用しました。

⚠️ 使用上の注意

本剤は小児用ですが、鼻炎用内服薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがあります。)
4. 長期連用しないでください

🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - (7) 次の診断を受けた人。
緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。

その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

(裏面へ続く)

再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

口のかわき、眠気

4. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください






<効能・効果>

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

<用法・用量>

次の1回量を添付のカップではかり、1日3回毎食後及び必要な場合には、就寝前に服用してください。

また、場合によっては、1日6回まで約4時間の間隔を置いて服用してください。

	7才以上 11才未満	3才以上 7才未満	1才以上 3才未満	6ヶ月以上 1才未満	3ヶ月以上 6ヶ月未満	3ヵ月未満
	10mL	6.5mL	5 mL	4 mL	3 mL	服用しないこと
1回量						×

用法・用量に関連する注意

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合のみ服用させてください。

<成分・分量>

1日量（60mL）中

成分	分量	作用
クロルフェニラミンマレイン酸塩	6mg	アレルギー症状を抑え、鼻水やくしゃみ、なみだ目を緩和します。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	55mg	鼻粘膜のうっ血を改善し、鼻づまりを緩和します。
カンゾウエキス (原生薬換算量)	70mg (280mg)	炎症を抑えるとともに、アレルギー症状を緩和する生薬です。
サイシン流エキス (原生薬換算量)	0.2mL (200mg)	鼻づまり、鼻水を緩和する生薬です。

添加物：白糖、クエン酸、クエン酸Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、プロピレングリコール、パラベン、香料、エタノール、バニリン

保管及び取り扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または次の所にお問い合わせください。

大昭製薬株式会社 おくすり相談室

電話 0748-88-4181

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

発売元 京都薬品ヘルスケア株式会社
京都市中京区西ノ京月輪町38番地

製造販売元 **大昭製薬株式会社**
滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168

®登録商標