

使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

鼻炎カット

鼻炎用内服薬

第2類医薬品

〔特 徴〕

- 花粉・ハウスダストによるアレルギー性鼻炎や急性鼻炎のくしゃみ、鼻みず、鼻づまりによく効きます。
- リゾチーム塩酸塩がハレをおさえて、のどの痛みや鼻づまりをやわらげ、また鼻汁の粘りを下げて排出しやすくします。
- のみやすい細粒状で、また携帯しやすいスティック包装になっています。



⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないこと

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある。)

4. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。

高熱、排尿困難

(6) 次の診断を受けた人。

緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	頭痛
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
シ ョ ッ ク (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。

症状の名称	症 状
無顆粒球症	突然の高熱、さむげ、のどの痛み等があらわれる。

3.服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ

4.5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効 能〕

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：

くしゃみ、鼻みず（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

〔用法・用量〕

次の量を、毎食後に服用すること。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
15歳以上（成人）	1 包	3 回
11歳～14歳	$\frac{2}{3}$ 包	
7歳～10歳	$\frac{1}{2}$ 包	
7歳未満	服用しないこと	



＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2)用法・用量を厳守すること。

〔成 分〕 3包（成人の1日服用量）中

成 分	含 量	は た ら き
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	抗ヒスタミン作用により、鼻みず、鼻づまり、くしゃみを和らげます。
フェニレフリン塩酸塩	10mg	血管収縮作用により、粘膜のうっ血を改善し、鼻づまりを緩和します。
ベラドンナ総アルカロイド	0.4mg	副交感神経を抑制して、鼻みずなどの分泌を抑えます。
リゾチーム塩酸塩	90mg (力価)	炎症を抑え、鼻汁の粘りを下げて排出しやすくします。

添加物としてD-ソルビトール、乳糖水和物、トウモロコシデンプン、無水ケイ酸、*l*-メントール、カカオ末、グリセリン、エチルバニリン、ラッカセイ油、プロピレングリコール、香料を含有する。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4)配置期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (5)1包を分割して服用した残りは袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。



〔包 装〕 1包1.0g 12包入

本剤を服用されて、変わった症状があらわれるなど、何かお気づきの点がございましたら、下記にご連絡頂きますようお願い申し上げます。

ダイト株式会社 安全管理室 お客様相談係

〒101-0047 東京都千代田区内神田3-6-2 アーバンネット神田ビル 電話(03)5294-7147

受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元

DAITO **ダイト株式会社**

富山県富山市八日町326番地

143AN