

服用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

急性またはアレルギー性鼻炎の諸症状に

ヒスパノン鼻炎[®]内服液

鼻炎用内服薬

使用説明書

- ◇鼻炎症状は、空気中の異物により起こりやすいですが、それ以外にも、いろいろの原因があるとされています。
- ◇鼻炎症状の最も効果的治療は早期に手当てすることです。
- ◇本剤には、アレルギーに拮抗する抗ヒスタミン剤として塩酸イソチベンジルを、炎症を抑える抗炎症剤として塩化リゾチムを配合しております。
- ◇塩酸イソチベンジルは他の抗ヒスタミン剤のマレイン酸クロルフェニラミンに比べ、モルモット摘出腸管を用いたヒスタミンけい縮に対して7倍の抗ヒスタミン作用があるとされています。
- ◇本剤は1回1本のみ切りタイプの液剤ですので、服用に便利です。

⚠【使用上の注意】

❌してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください。
本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気があらわれることがあります)
4. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)授乳中の人。
(4)高齢者。
(5)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(6)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(7)次の症状のある人。 高熱、排尿困難
(8)次の診断を受けた人。 緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1)服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれます。
皮膚粘膜眼症候群 (ステーブスジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれます。

(2)5～6日間服用しても症状がよくなる場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
口のかわき

【成分・分量】1日量(60mL)中

塩酸イソチベンジル……………12mg・dl-塩酸メチルエフェドリン……………110mg
塩化リゾチム……………90mg(力価)・無水カフェイン……………150mg
添加物としてクエン酸、塩化Na、L-グルタミン酸Na、白糖、ポリリン酸Na、安息香酸Na、パラベン、カラメル、香料、プロピレングリコール、エタノールを含有します。

【効能・効果】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず(鼻汁過多)、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重(頭が重い)。

【用法・用量】

次の量を1日3回服用してください。ただし、服用間隔は約4時間おいてください。なお、必要により1日6回まで服用することができますが、その場合には約4時間の間隔をおいてください。

年 齢	大人(15歳以上)	15 歳 未 満
1 回 量	10mL(1本)	服用しないこと

【用法・用量に関連する注意】

(1)定められた用法・用量を厳守してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

製造販売元・お問い合わせ先

松本製薬工業株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町大原市場160

〒520-3433 TEL.0748-88-3196