

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう保管してください。

鼻炎用内服薬

第2類医薬品



アルガード®鼻炎クールアップ®

花粉やハウスダストなどによって起こる鼻みず・くしゃみ・鼻づまりなどのつらいアレルギー症状は、時間と場所を選びません。「アルガード®鼻炎クールアップ®」は、水なしで服用できるソフトチュアブル錠ですので、つらい鼻症状がでたその時にどこでも服用できます。バランスよく配合された有効成分が、効果的にあなたのつらい症状を改善してくれます。

アルガード鼻炎クールアップの特徴

① 鼻みず・くしゃみ・鼻づまりなどの症状にすぐれた効果があります。

アレルギー症状にはたらき、
鼻みず、くしゃみ、
鼻づまりをおさえます。

αクロルフェニラミン
マレイン酸塩

フェニレフリン塩酸塩

交感神経にはたらいて、
鼻粘膜の充血やはれをおさえ、
鼻づまりを改善します。

副交感神経にはたらいて、
鼻みずの分泌、なみだ目をおさえます。

ベラドンナ
総アルカロイド

無水カフェイン

頭重(頭が重い)を効果的に
やわらげます。

② 服用しやすい製剤設計です。

- 水なしで服用できる、やわらかい噛みごこちのソフトチュアブル錠です。
- 苦味をおさえたフレッシュメントール味が鼻までスーッと広がります。

③ 時間帯と場所を選ばず服用できます。

- 持ち運びしやすいコンパクトケース入りなので、携帯に最適。
- 食前・食後を考えずいつでも服用できます。
- なめてもかんでもOK!



通勤・通学中でも…

会議中でも…

使用上の注意 ⚠

● **してはいけないこと** ❌ (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬、催眠鎮静薬)

2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある)

3. 長期連用しないでください。

● 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| (1) 医師の治療を受けている人 | (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 |
| (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 | (6) 次の症状のある人…………… 高熱、排尿困難 |
| (3) 高齢者 | (7) 次の診断を受けた人 |
| (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人 | … 緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧 |

2. 次の場合は直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	頭痛
その他	排尿困難、顔のほてり、異常なまぶしさ

(2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。…………… 口のかわき、便秘

効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭が重い

成分・分量（1日量：3錠中）

有効成分	配合量
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	6mg
フェニレフリン塩酸塩	15mg
ペラドンナ総アルカロイド	0.4mg
無水カフェイン	60mg

添加物：トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、D-マンニトール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ポリソルベート80、スクラロース、酒石酸、無水ケイ酸、l-メントール、ハッカ油、セルロース、ステアリン酸Mg、香料

用法・用量

本剤はチュアブル錠なので、かむか、口中で溶かして服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
15才以上	1錠	3回（4時間以上の間隔をあけること）
15才未満	服用しないこと	

●用法・用量を厳守してください。

保管及び取扱上の注意

- 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所にキャップをしっかりとめて保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる）
- 濡れた手で触れないでください。（品質が変わる）
- 使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は服用しないでください。
なお、使用期限内であっても一度内袋を開封した後は、なるべく早くご使用ください。

●お願い

服用の時は、ケースをイラストのように開け、1錠ずつ取り出してください。



お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。
東京：03-5442-6020 大阪：06-6758-1230
受付時間 9:00～18:00（土、日、祝日を除く）

オート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1

400795602