

服用に際して、この文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鼻炎用内服薬

指定第2類医薬品

リコデ®鼻炎シロップ

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
2. 服用後、乗物等の運転をしないで下さい。
(眠気等があらわれることがあります。)
3. 長期連用しないで下さい。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
 - (7) 次の診断を受けた人。 緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合には直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血・	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能又は効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

用法及び用量

下記の量を1日3回食後に服用して下さい。なお、必要により1日6回まで服用することができますが、その場合には約4時間の間隔をおいて服用して下さい（計量容器を添付する）。

年齢	1回量
15歳以上	10mL
11歳以上15歳未満	6.5mL
7歳以上11歳未満	5mL
3歳以上7歳未満	3mL
1歳以上3歳未満	2.5mL
1歳未満の乳児	服用しないで下さい

（用法・用量に関連する注意）

- （1）用法・用量を厳守して下さい。
- （2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- （3）2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させて下さい。

成分及び分量

1本（30mL）中に次の成分を含んでいます。

成分	分量
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3mg
d0-メチルエフェドリン塩酸塩	50mg
無水カフェイン	50mg
サイシン乾燥エキス	15mg

添加物として白糖、D-ソルビトール、クエン酸、サッカリンNa、エタノール、安息香酸Na、パラベン、香料、グリセリン、プロピレングリコールを含有します。

保管及び取り扱い上の注意

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- （2）小児の手の届かない所に保管して下さい。
- （3）他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- （4）使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先

発売元：ゼネル薬品工業株式会社
電話番号：06-6352-2381
受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

発売元：ゼネル薬品工業株式会社 大阪市北区天満3丁目6番1号
製造販売元：ゼネル薬工粉河株式会社 和歌山県紀の川市粉河840番地