

平成26年10月改訂（記載要領変更に伴う改訂）

この説明書は、使用前に必ずお読み下さい。
また、必要時に読めるよう保管しておいて下さい。

急性・アレルギー性鼻炎薬

第2類医薬品

ミナトシキ液 20mL

MINATOSIKI LIQUID

アレルギー性鼻炎は、鼻水、鼻づまり、くしゃみを主症状とする疾病で、スギの花粉、ハウスダストなどが原因物質といわれています。ミナトシキ液は、鼻粘膜の血管を収縮して充血をとりのぞき、アレルギー症状をおさえる成分を配合しています。また粘性基剤を用いているので、点鼻後の鼻腔からの液ダレが少なく、使用感のすぐれた点鼻薬です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 次の人は使用しないで下さい
7歳未満の乳幼児
2. 点鼻薬にのみ使用し、目や耳に使用しないで下さい
3. 長期連用しないで下さい



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 薬などによりアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、腫脹、刺激感等）を起こしたことがある人
(4) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

3. 3日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

★裏面につづく

【効能・効果】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：
鼻づまり、鼻水（鼻汁過多）、くしゃみ、頭重（頭が重い）

【用法・用量】

下記の量を、鼻腔内にスポイトで滴下して下さい。なお、適用間隔は3時間以上あけて下さい。

年 齢	1回量	1日使用回数
成人(15歳以上)及び 7歳以上の小児	1～2滴	4～5回
7歳未満の乳幼児	使用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】

- 定められた用法・用量を厳守して下さい。過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- 点鼻用にのみ使用して下さい。

【成分・分量】

1 mL中

有効成分	ナファゾリン塩酸塩 クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.5mg 1mg
添加物	ベンゼトニウム塩化物、グリセリン、マクロゴール400(ポリエチレングリコール)、プロピレングリコール、銅クロロフィリンナトリウム、 <i>l</i> -メントール	

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい（誤用の原因になったり品質が変わります）。
- 他の人と共用しないで下さい。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本製品に関するお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ミナト製薬株式会社 「お客様相談室」
フリーダイヤル：0120-47-3710
受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）



発売
ミナト製薬株式会社
東京都中央区銀座1丁目14番11号

製造販売 
原沢製薬工業株式会社
東京都港区高輪3丁目19番17号