



服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に、読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

「モリ」ちくのう錠

特 徴

「モリ」ちくのう錠は、辛夷、桔梗など成分欄記載の16種類の生薬で構成される和漢薬の、のみやすいエキス糖衣錠です。本剤の服用で鼻づまりなどの不快な症状が改善され、ちくのう症、鼻カタルなど効能欄記載の鼻の病気に効きめがあります。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - 胃腸が弱く冷え性の人。
 - 高齢者。
 - 薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
むくみ
 - 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感、食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感や こわばりに加えて、脱力感、筋肉痛が あらわれ、徐々に強くなる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能又は効果

蓄膿症、副鼻腔炎、鼻カタル、鼻閉塞、臭鼻症

用法及び用量

次の量を朝夕空腹時に、水またはお湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人(16歳以上)	3～6錠	2 回
15歳以下8歳以上	2～3錠	

<用法及び用量に関連する注意>

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分及び分量

本剤6錠(2.4g)中、下記生薬の水製乾燥エキス1.2gが含まれています。

キキョウ(桔梗)……………2g	ソウジュツ(蒼朮)……………0.1g
カンソウ(甘草)……………1.5g	サンシシ(山梔子)……………0.1g
シャクヤク(芍薬)……………1.5g	サイコ(柴胡)……………0.1g
タイソウ(大棗)……………1.5g	ショウマ(升麻)……………0.1g
キジツ(枳実)……………1g	チモ(知母)……………0.1g
ショウキョウ(生姜)……………1g	バクモンドウ(麦門冬)……………0.1g
セッコウ(石膏)……………1g	シンイ(辛夷)……………1g
オウゴン(黄芩)……………0.1g	ピフヨウ(枇杷葉)……………0.1g

添加物として、白糖、タルク、アラビアゴム、酸化チタン、ステアリン酸マグネシウム、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、カルナウバロウ、黄色4号(タートラジン)を含有しています。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)

本剤についてのお問い合わせ先

大杉製薬株式会社 お客様相談室
〒545-0002 大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2
電話(06)6629-0062
受付時間 10時から17時まで(土、日、祝日を除く)

大杉製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2