

10097185

第3類医薬品

のどぬる
のどに直接ぬれる
殺菌・消毒



のどの殺菌・消毒

のどに直接ぬれる
長い綿棒 15本入

のどぬる

のどぬる

のどの殺菌・消毒
のどに直接ぬれる



20g



第3類医薬品

使用
期限
製造
番号

第3類医薬品

③



のどの殺菌・消毒
のどに直接ぬれる

のどぬる

第3類医薬品



のどの殺菌・消毒

のどに直接ぬれる

のどぬる

第3類医薬品

口腔内殺菌消毒薬

(Throat Disinfectant)

のどの殺菌・消毒 のどぬる

殺菌・消毒効果の高い有効成分を自分で直接ぬることができます。

ご使用に際し、この説明書きを必ずお読みください。また必要な時に読めるように大切に保管してください。使用期限(パッケージ側面およびビンラベルに記載)を過ぎた製品は使用しないこと

販売名: のどぬる

第3類医薬品

△ 使用上の注意

⊗ (してはいけないこと)

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

① 次の人は使用しないこと

- (1) 本剤またはヨウ素による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫など)を起こしたことがある人
- (2) 甲状腺疾患のある人
- (3) 2才未満の乳幼児

② 長期連用しないこと

③ 大量に使用しないこと

※ (相談すること)

① 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること

- (1) 医師または歯科医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦、または妊娠していると思われる人
- (3) 授乳中の人
- (4) 本人または家族がアレルギー体質の人
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (6) 患部が広範囲の人または口内のただれがひどい人

② 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書きを持って医師または薬剤師に相談すること

- (1) 使用中または使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、吐気
その他	胸苦しさ、不快感

まれに下記のような重篤な症状が起こることがあります
その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさなどとともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさなどがあらわれる
アナフィラキシー様症状	胸苦しさ、むくみ、じんましん、発疹などがあらわれる

- (2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

【効能・効果】 のどの殺菌・消毒

【用法・用量】 適宜、適量を患部に塗布してください

<用法・用量に関連する注意>

- (1) のどにぬるとき、綿などにしみこませ過ぎないように注意すること
- (2) 薬液を誤って大量に飲み込んだ時は、直ちに医師の診療を受けること
- (3) 小児に使用させる場合には特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させること

【成分・分量】 (100mL中)

成分	分量	はたらき
ヨウ素	1.0g	のどの殺菌・消毒

添加物として、ヨウ化K、グリセリン、ハッカ水、香料(フェノール)を含有する

<成分・分量に関連する注意>

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯など)が変色することがある

【保管および取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して立てて保管すること
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

● 使用中に液がこぼれ衣類などが着色したら、すぐに水洗いすること

小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問い合わせ先

お客様相談室 ☎ 06(6203)3625

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

ホームページアドレス <http://pr.kobayashi.co.jp>

製造販売元

福地製薬株式会社

〒529-1606 滋賀県蒲生郡日野町寺尻824



4 987072004104

MADE IN JAPAN

副作用被害救済制度
☎ 0120(149)931

のどの殺菌・消毒
のどに直接ぬれる
のどぬる

10096003

対象年齢 2才以上
用法・用量 適宜、適量を患部に塗布

のどの殺菌・消毒
のどに直接ぬれる
のどぬる

第3類医薬品

HapYcom
ハピコム

HapYcom
ハピコム

第3類医薬品

のどの殺菌・消毒

のどに直接ぬれる

長い綿棒 15本入

のどぬる

のどの殺菌・消毒
のどに直接ぬれる

のどぬる



対象年齢: 2才以上
内容量: 20g

小林製薬

第3類医薬品

HapYcom
ハピコム

第3類医薬品

のどの殺菌・消毒

のどに直接ぬれる

のどぬる

用法・用量 適宜、適量を患部に塗布
対象年齢 2才以上

使用期限
製造番号

①

のどの殺菌・消毒

のどに直接ぬれる

のどぬる

用法・用量

適宜、適量を患部に塗布

対象年齢

2才以上

第3類医薬品

のどの殺菌・消毒

のどぬる

副作用被害救済制度
0120(149)931

Hapicom
AETL

口腔内殺菌消毒薬

(Throat Disinfectant)

のどの殺菌・消毒 のどぬる

殺菌・消毒効果の高い有効成分を自分で直接ぬることができます。

ご使用に際し、この説明書きを必ずお読みください。また必要な時に読めるように大切に保管してください。使用期限(パッケージ側面およびビンラベルに記載)を過ぎた製品は使用しないこと

販売名: のどぬる

第3類医薬品

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

① 次の人は使用しないこと

- ① 本剤またはヨウ素による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫など)を起こしたことがある人
- ② 甲状腺疾患のある人
- ③ 2才未満の乳幼児
- ④ 長期連用しないこと
- ⑤ 大量に使用しないこと

Ⓜ 相談すること

① 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること

- (1) 医師または歯科医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦、または妊娠していると思われる人
- (3) 授乳中の人
- (4) 本人または家族がアレルギー体質の人
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (6) 患部が広範囲の人または口内のただれがひどい人

② 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書きを持って医師または薬剤師に相談すること

- (1) 使用中または使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、吐気
その他	胸苦しさ、不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります
その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさなどとともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさなどがあらわれる
アナフィラキシー様症状	胸苦しさ、むくみ、じんましん、発疹などがあらわれる

- (2) 5~6日間使用しても症状がよくなる場合

【効能・効果】 のどの殺菌・消毒

【用法・用量】 適宜、適量を患部に塗布してください

<用法・用量に関連する注意>

- (1) のどにぬるとき、綿などにしみこませ過ぎないように注意すること
- (2) 薬液を誤って大量に飲み込んだ時は、直ちに医師の診療を受けること
- (3) 小児に使用させる場合には特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させること

【成分・分量】 (100mL中)

成分	分量	はたらき
ヨウ素	1.0g	のどの殺菌・消毒

添加物として、ヨウ化K、グリセリン、ハッカ水、香料(フェノール)を含有する

<成分・分量に関連する注意>

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯など)が変色することがある

【保管および取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して立てて保管すること
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

● 使用中に液がこぼれ衣類などが着色したら、すぐに水洗いすること

発売元
小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

— 製品のお問い合わせ先 —

お客様相談室 ☎ 06(6203)3625

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

ホームページアドレス <http://pr.kobayashi.co.jp>

製造販売元

福地製薬株式会社

〒529-1606 滋賀県蒲生郡日野町寺尻824

紙箱 トレイ袋



MADE IN JAPAN