

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう保管してください。

第2類医薬品

口内炎・舌炎治療剤

付着性基剤 フムレート軟膏

- ◆フムレート軟膏は、口内炎・舌炎などの炎症を抑え、傷ついた粘膜の修復を早めるシコンエキスに、同じく炎症を抑えるグリチルレチン酸、細菌による患部の汚染を防ぐクロルヘキシジン塩酸塩を効果的に配合した付着性口内軟膏です。
- ◆フムレート軟膏は、口中の水分にふれると、口腔粘膜の表面に長時間付着しますから有効成分が持続的に患部に作用し、口内炎・舌炎の炎症を効果的に取り去り、優れた効き目があります。また、炎症を起こしている患部をおおいますから、創面を外部刺激から保護し、一層の効果があります。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

○目には使用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 今までに薬や化粧品等による刺激症状又はアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人
 - (2) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
口内・くちびる	発疹・発赤、かゆみ等

- (2) 症状が悪化した場合
- (3) 数回使用しても症状の改善がみられない場合

効 能

口内炎、舌炎

用法・用量

患部をきれいにした後、本剤の適量（患部を本剤の薄い膜で十分覆うだけの量）をとり、1日2～4回塗布してください。

用法及び用量に関連する注意

- (1)本剤は口腔用にのみ使用し、眼科用及びその他に使用しないでください。
- (2)定められた用法を守ってください。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)外用にのみ使用し、内服しないでください。

成分・分量 (100g中)

成分	含量	はたらき
シコンエキス	0.2g	患部の炎症を鎮め、傷ついた粘膜の修復を早めます。
グリチルレチン酸	0.3g	患部の炎症を鎮めます。
クロルヘキシジン塩酸塩	0.2g	細菌による汚染を防ぎます。

添加物として流動パラフィン、カラヤガム、その他1成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。(使用期限は外箱及びチューブに記載又は刻印してあります。)

ワンポイントアドバイス

- ◎指先をきれいにしてからつけてください。
- ◎チューブのあけ方：本品は閉鎖チューブを使用しています。
初めて使用する際には、キャップ上部の凸部でチューブの口を軽く押すと開きます。
- ◎使用後はチューブのキャップを強くしめて保管してください。
- ◎飲食により軟膏が取れることがありますから、飲食後に塗ることをお勧めします。

ワムレート軟膏の赤色・・・これはシコンエキスの色であり、経時変化等により変色しているものではありません。
この赤色は、セッケンにふれる等アルカリ性の条件下で紫色になります。
衣類等に付着すると落ちにくいので注意してください。

ワムレート軟膏と水・・・たえず唾液で濡れている口の中に付着させるため、水分に出会うと固まる性質を持たせてあります。
水分のついた指や湿らせたティッシュでチューブ口を拭かないでください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お問い合わせ先

本剤のご使用により、何か変わった症状があらわれるなど、お気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

三宝製薬株式会社 お客様相談室

電話03-3952-0100

月～金曜日 9:00～17:00 (祝祭日を除く)



発売元  **三宝製薬株式会社**
東京都新宿区下落合2-3-18

製造販売元  **池田薬品工業株式会社**
富山県中新川郡上市町若杉12