

使用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

## 〈歯科口腔用薬〉

歯槽膿漏・歯肉炎の症状緩和に  
リゾチーム塩酸塩配合

# デンタルカプセル

第3類医薬品

- ◆歯をみがくと血がでる、歯ぐきが赤くはれるなどの症状は歯槽膿漏のはじまりです。虫歯のように痛みがないためつい放置しがちで、知らず知らずのうちに症状が悪化しますので早い目のお手当が大切です。
- ◆**デンタルカプセル**はこのような歯槽膿漏・歯肉炎に伴う諸症状の緩和に適切な効果をあらわします。



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は服用しないでください。

本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。
  - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
  - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
  - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。
  - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

## 効能・効果

歯槽膿漏・歯肉炎に伴う諸症状（歯ぐきの出血、発赤、はれ、痛み）の緩和

## 用法・用量

大人（15才以上） 1回2カプセル、7才以上15才未満 1回1カプセル  
1日3回食後かまずに服用してください。

### ＜用法及び用量に関連する注意＞

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児又は7才未満の乳幼児に服用させないでください。

## 成分・分量

1日量(6カプセル)中

成分	含量	はたらき
リゾチーム塩酸塩	90mg(力価)	歯肉の炎症をしずめ、はれとうみを取り、粘膜や組織の新陳代謝を促進し歯ぐきを健康にします。
トコフェロールコハク酸エステルカルシウム	102mg	歯肉の毛細血管を強くし、血液の流れを良くして歯ぐきの老化を防ぎます。
アスコルビン酸散 (アスコルビン酸450mgを含む)	455.47mg	歯ぐきをひきしめ、血管壁を強くすることで、歯ぐきからの出血を止めます。
カルバゾクロム	6mg	血管を強くし、歯ぐきからの出血を止めます。

添加物として、エチルセルロース、乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム、カプセル〔ゼラチン、青色1号、黄色5号、ラウリル硫酸ナトリウム〕を含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

### 【カプセルの取り出し方】

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用して下さい。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)



- なお口内炎の治療には**デンタルピルクリーム**、歯痛には**デンタルクリーム**をお使いください。

本品についてのお問い合わせは  
お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

**万協製薬株式会社**

電話 0598-37-2088

受付時間 AM10:00～PM5:00  
(ただし、土、日、祝日を除きます。)



発売元

**日邦薬品工業株式会社**

東京都渋谷区代々木3-46-16  
<http://www.nippo-yakuin.jp/>

製造販売元



**万協製薬株式会社**

三重県多気郡多気町五桂1169-142