

歯槽膿漏・歯肉炎  
口内炎薬

# ピタバス

歯槽膿漏・歯肉炎は、口腔内の細菌が原因で発症する炎症性の疾患です。初期の段階では自覚症状がほとんどないものの、進行していくと、歯ぐきの出血、はれ、うみ、痛み、口臭などの不快症状があらわれてきます。このような症状があらわれてきたら早めに手当てすることが大切です。

本剤は、抗炎症作用のあるグリチルリチン酸二カリウム、殺菌作用のあるセチルピリジニウム塩化物水和物とヒノキチオール、粘膜組織修復作用のあるアラントインとパンテノールといった3つの作用の有効成分を配合しています。お使いになりますと、これらの成分が同時に患部で働いて、すぐれた効き目を発揮します。

さらに、本剤は口内炎に対してお使い頂いてもすぐれた効き目を発揮するように処方設計されています。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
その他	味覚異常

- しばらく使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 用法・用量

歯槽膿漏・歯肉炎	1日2回(朝・晩)ブラッシング後、適量(約0.3g)を指にのせ、歯ぐきに塗擦してください。
口内炎	1日2～4回、適量を患部に塗布してください。

### <用法・用量に関連する注意>

- 用法・用量を守ってください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 歯科用にのみ使用してください。
- 約0.3gの目安量として、約1.5cmとり出して使用してください。

(裏面へ続く)

## 効能・効果

歯槽膿漏・歯肉炎における諸症状(歯ぐきの出血・発赤・はれ・うみ・痛み・むずがゆさ、口のねばり、口臭)の緩和、口内炎

## 成分・分量(1g中)

成分・分量	働 き
グリチルリチン酸二カリウム 4.0mg	抗炎症作用により、炎症を鎮めて、はれを緩和します。
セチルピリジニウム塩化物水和物 0.5mg	殺菌作用により、患部の細菌汚染を防ぎます。
ヒノキチオール 1.0mg	
アラントイン 3.0mg	組織修復作用により、口内の粘膜組織を修復します。
パンテノール 3.0mg	

[添加物]マクロゴール、カルボキシビニルポリマー、グリセリン、流動パラフィン、ジメチルポリシロキサン、セタノール、ワセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ステアリン酸ソルビタン、パラベン、エドト酸Ca/2Na、水酸化Na、香料

## 保管及び取扱い上の注意

- ① 高温をさげ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- ② 小児の手の届かない所に保管してください。
- ③ 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ④ 使用期限(外箱及びチューブに記載)をすぎた製品は使用しないでください。

### 容器の使い方



キャップ上部の突起部でチューブの出し口(アルミシール)にしっかり穴をあけてお使いください。  
\*使用後は必ずキャップをしっかりしめてください。

### 本製品に関するお問い合わせ

お買い求めのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566  
受付時間:月~金(祝日を除く)9:00~17:00



 製造販売元 興和株式会社

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14