

welcia

第2類医薬品

かぜの初期の諸症状に **葛根湯液**

用法・用量 1日3回、食間、1回1本 (30mL)

対象年齢 15才以上

welcia

第2類医薬品

**葛根湯液**

かぜの初期の諸症状に

眠くなる成分は入っていません

さむけ

発熱

のどの痛み

対象年齢：15才以上

内容量：30mL×3本



使用期限

製造番号

08 JUL 150

第2類医薬品

第2類医薬品

## ウエルシア葛根湯液DX

服用前に説明書きをよくお読み下さい。  
また、大切に保管して下さい。

## 【使用上の注意】

- ⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり副作用・事故が起こりやすくなります) 長期連用しないで下さい

## 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)(4)胃腸の弱い人(5)発汗傾向の著しい人(6)高齢者(7)今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人(8)次の症状のある人：むくみ、排尿困難(9)次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この商品を持って医師又は薬剤師に相談して下さい

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

(2)5~6回服用しても症状がよくならない場合

## 【効能効果】

かぜの初期の諸症状(発熱、さむけ、頭痛、肩・首筋のこぼり、鼻づまり、鼻水、のどの痛み)

## 【用法用量】

成人(15才以上)1回1本、1日3回食間によく振ってから服用して下さい。

●用法用量に関する注意

- (1)用法用量を厳守して下さい。  
(2)本品は1回に1本を飲みきり、分割服用はしないで下さい。

## 【成分量】90mL(30mL×3本)中

葛根湯エキス 4340mg  
 カッコン8.0g、マオウ4.0g、タイソウ4.0g、  
 ケイヒ3.0g、シャクヤク3.0g、カンソウ2.0g、  
 ショウキョウ1.0g

添加物としてハチミツ、安息香酸Na、パラベン、ステアリン酸ポリオキシシル、香料を含有します。

## 【保管及び取り扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。  
(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。  
(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)  
(4)表示の期限内に服用して下さい。  
●配合成分により、沈殿を生じることがあります。よく振って服用して下さい。

## ■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 ぐすり相談室  
 電話：(0748) 88-3180(大代表)  
 受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931



製造販売元  
 滋賀県製薬株式会社  
 滋賀県甲賀市甲賀町879



葛根湯液

かぜの初期  
の諸症状に

さむけ

発熱

のどの痛み

私たちイオン・ウエルシアグループでは、環境にやさしいパッケージを使っております。

280  
280ml (9.46fl.oz.)

PRINTED WITH  
 SOY INK

開封年月日

開封時に記入してください。