

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

改源 漢方製剤

第一葛根湯エキス顆粒D

第2類医薬品

「葛根湯」は、漢方の古典「傷寒論」などに記載されている7種類の生薬からなる漢方製剤です。本剤は「葛根湯」のエキスを服用しやすい顆粒剤にしたもので、感冒、鼻かぜ、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛みにも効果を現わします。

〔葛根湯に使用される生薬〕



カクコン(葛根)



マオウ(麻黄)



タイソウ(大棗)



ケイヒ(桂皮)



シャクヤク(芍薬)



カンソウ(甘草)



ショウキョウ(生姜)

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)
次の人は服用しないでください
生後3カ月未満の乳児。

👤 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに次の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

(裏面もお読みください。)

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 1ヵ月位(感冒、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください

効能・効果

感冒、鼻かぜ、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

用法・用量

次の量を、食前又は食間に服用してください。なるべく温湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1包	3回
7才以上15才未満	2/3包	
4才以上 7才未満	1/2包	
2才以上 4才未満	1/3包	
2才未満	1/4包	

- 食前とは、食事の1時間から30分位前のことです。
- 食間とは、食事のあと、2時間位たったときのことです。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

成分・分量 3包(大人1日量)中 (1包:2g)

葛根湯エキス(1/2量).....				850mg
カッコン 2.0g	マオウ 1.5g	タイソウ 1.5g	} より抽出	
ケイヒ 1.0g	シャクヤク 1.0g	カンゾウ 1.0g		
ショウキョウ 0.5g				

添加物としてトウモロコシデンプン、乳糖、セルロース、ケイ酸Al、D-マンニトール、カルボキシメチルスターチNa、ヒドロキシプロピルセルロース、ラウリル硫酸Na、デヒドロ酢酸Na、カラメル、ケイヒ油を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になりたり品質が変わったりします。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 外箱に表示の使用期限が過ぎた製品は服用しないでください。



お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記にお願い申し上げます。

株式会社カイゲン お客様相談室 電話06-6202-8911
受付時間:9:00~17:00(土曜、日曜、祝日を除く)

発売元 **株式会社 カイゲン**
大阪市中央区道修町2丁目5番14号

製造販売元 **第一薬品工業株式会社**
富山市草島15番1