

葛根湯濃縮液製剤

眠くなる成分を含まない
液体のかぜ薬

ビューンかぜ漢方内服液

ビューンかぜ漢方内服液は漢方の原典である「傷寒論^{しょうかんろん}」に記載されている「葛根湯^{かつこんとう}」の水製抽出液です。葛根湯は漢方医学的にかぜの初期に用いられる代表的な薬で「煎じ薬」として用いられます。ビューンかぜ漢方内服液はこの煎じ薬の製法を工業的に確立して品質を安定させた内服液です（エキス製剤ではありません）。「汗は出ていないが、肩・首筋のこわばりがあって、発熱して、悪寒（さむけ）がして頭痛がする。また、鼻水がでて、のどが痛い等」のかぜのひきはじめの症状がみられるときに、特に優れた効果を発揮します。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）
長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

成分・分量

本品1日量90mL (30mL×3本) 中

成分	分量	はたらき	
葛根湯濃縮液 (下記生薬の水製抽出液)	81mL	日局カッコンから日局ショウキョウまでの葛根湯を構成する生薬の水製抽出液が、かぜの初期の諸症状(発熱,寒け,頭痛,肩・首筋のこわばり,鼻閉,鼻水,のどの痛み)に効果を発揮します。	
生薬	日局カッコン		8g
	日局マオウ		4g
	日局タイソウ		4g
	日局ケイヒ		3g
	日局シャクヤク		3g
	日局カンゾウ		2g
	日局ショウキョウ		1g

添加物として、D-ソルビトール,白糖,安息香酸ナトリウム,パラベン,香料を含みます。

効能・効果

かぜの初期の諸症状(発熱,寒け,頭痛,肩・首筋のこわばり,鼻閉,鼻水,のどの痛み)

用法・用量

次の量を,食間によく振ってから服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本	3回
15歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は,本質的に沈殿を含んでいますので,服用前によく振ってから服用してください。

かぜの養生法


かぜをこじらせると合併症をおこして,からだの調子を大きくくずしてしまうことがありますから,保温・保湿を心掛け,消化のよい栄養豊富な食物をとり安静にして,早めに治すことが大切です。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限(外箱及びビンラベルに記載)を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) ビンをあけたら飲みきってください。
- (6) ビンをあけたまま保存しないでください。

〈お問い合わせ先〉 本剤についてのお問い合わせは下記までご連絡ください。
新生薬品工業株式会社
電話番号 0744-52-3330 受付時間 月~金曜日 9:00~17:00(祝日,年末年始を除く)

〈発売元〉

 株式会社 中京医薬品

愛知県半田市亀崎北浦町2-15-1

製造販売元
新生薬品工業株式会社
奈良県高市郡高取町清水谷1269