

使用
期限
製造
番号

第2類医薬品

葛根湯

眠くなる成分は、
含んでいません。

第2類
医薬品



【効能・効果】

体力中等度以上のものの次の
諸症：感冒の初期（汗をかいて
いないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭
痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の
痛み

【用法・用量】

大人（15才以上）1回1瓶
（30mL）を1日3回食間によく
振ってから服用してください。

（用法・用量に関連する注意）

- （1）用法・用量を守ってください。
- （2）本剤は15才未満の小児には
服用させないでください。
- （3）本剤は、生薬成分を配合した内
服液ですので、沈澱を生じること
があります。よく振ってから服
用してください。

【成分・分量】

1日量90mL（30mL×3瓶）中
に次の成分を含んでいます。

日局葛根湯エキス（軟）
8,300mg

日局カココン（葛根）8.0g、日
局マオウ（麻黄）4.0g、日局
タイソウ（大棗）4.0g、日局
ケイヒ（桂皮）3.0g、日局シャ
クヤク（芍薬）3.0g、日局カ
ンゾウ（甘草）2.0g、日局ショ
ウキョウ（生姜）1.0g

上記生薬より製した軟エキス
添加物として安息香酸Na、バ
ラベン、白糖、D-ソルビトール、
アルコール、プロピレングリコ
ール、香料を含んでいます。

体力中等度以上の方に

満量処方

（日本薬局方葛根湯エキス）

三宝葛根湯液

30mL×3

葛根湯

葛根湯


かぜの初期の症状に
鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり



4 961248 005683



紙



販売名
三宝葛根湯液

この説明文は、服用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4) 胃腸の弱い人。(5) 発汗傾向の著しい人。(6) 高齢者。(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8) 次の症状のある人。むくみ、排尿困難(9) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくなりない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 4.長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

製品についてのお問合せは、お買い求めのお店、又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

【お客様相談室】電話 03-3952-0100
月~金曜日 9:00~17:00 (祝日を除く)

製造販売元 **三宝製薬株式会社**
東京都新宿区下落合2-3-18

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)