

眠くなる成分を含まない

<満量処方>

葛根湯エキス製剤

葛根湯 内服液

30mL

第2類医薬品

販売名：NY葛根湯内服液α

△ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4)胃腸の弱い人。(5)発汗傾向の著しい人。(6)高齢者。(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8)次の症状のある人。むくみ、排尿困難(9)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

発売元 **日本薬剤株式会社** 使用期限

富山市東中野町一丁目1番1号
(お問い合わせ先)電話076-424-2239

製造販売元 **株式会社HBC** 製造記号

滑川市小林250番地1

ガラス:瓶 金属:キャップ

【成分・分量】1日量3本(90mL)中

葛根湯エキス…… 8300mg
(カクコン 8.0g、マオウ 4.0g、タイソウ)
4.0g、ケイヒ 3.0g、シャクヤク 3.0g
カンゾウ 2.0g、ショウキョウ 1.0g

より製したエキス
添加物として、白糖、D-ソルビトール、
果糖ブドウ糖液糖、ポリオキシエチレン
硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラ
ベン、エタノール、グリセリン、トメント
ール、プロピレングリコール、バニリン、
ベンジルアルコール、香料を含有する。

【効能・効果】体力中等度以上のものの次の諸症:感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】成人(15歳以上)1回1本、1日3回食間に服用してください。まれに微量の沈殿が生じる場合があるので、よく振ってから服用してください。〈用法・用量に関連する注意〉(1)用法・用量を厳守してください。(2)15歳未満の小児には服用させないでください。(3)本剤は1回1本の服用で飲みきり、飲み残しのないようにしてください。

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手のとどかない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931

97A1



4

