

しわがれ声・のどの不快感に

漢方製剤

エスエス響声破笛丸料エキス顆粒A

エスエス^{きょうせい は てきがんりょう}響声破笛丸料エキス顆粒Aは、漢方薬・響声破笛丸のエキスをのみやすい顆粒剤としたものです。

響声破笛丸は中国の医学書の古典『万病回春』^{まんびょうかいしゅん}に記載されている漢方処方方で、平素からのどが弱かったり、あるいは歌を歌ったり、演説のしすぎなど発声過度（声の出しすぎ）のために、のどに炎症を起こしてしわがれ声になったり、声がかすれたり、のどに不快感があるときにすぐれた効きめをあらわします。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください

生後3カ月未満の乳児。

2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

👤 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (5) 高齢者。
- (6) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。 むくみ
- (8) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病
- (9) 次の医薬品を服用している人。 瀉下薬（下剤）

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合。

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください

4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

軟便、下痢

■ 効能・効果

しわがれ声、咽喉不快

■ 用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用します。

年 齢	成人(15才以上)	7才~14才	4才~6才	2才~3才	2才未満
1回量	1包	2/3包	1/2包	1/3包	1/4包

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

■ 成 分 3包 (成人1日量：7.5g)中

響声破笛丸料水製乾燥エキス	3.5g
レンギョウ	2.5g
キキョウ	2.5g
カンゾウ	2.5g
ダイオウ	1.0g
シュクシャ	1.0g
センキュウ	1.0g
カシ	1.0g
アセンヤク	2.0g
ハッカ	4.0g

上記生薬より抽出したエキス

添加物として、乳糖、白糖、ステアリン酸Mg、ケイヒ油、*l*-メントールを含有します。

○本剤は天然の生薬から有効成分を抽出した製剤ですので、製品により顆粒剤の色・風味が若干異なることがあります。薬効には変わりありません。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

■ お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。

エスエス製薬株式会社 お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-028-193

受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）

発売元



エスエス製薬株式会社

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4

製造販売元

株式会社カーヤ

大阪府吹田市垂水町3-4-11

0708C

提携

天津泰達薬業有限公司

中国 天津市

9-8AO