

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## 全薬養生漢方®

けいしかじゅつぶとう

# 桂枝加朮附湯エキス〔細粒〕15 <漢方製剤>

## 第2類医薬品

桂枝加朮附湯エキス〔細粒〕15は、

1. 冷えると手足の関節や神経の痛みが悪化する方の関節痛、神経痛を改善する漢方薬です。
2. サラツとして服用しやすい淡褐色の細粒剤です。

### 【使用上の注意】



#### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児。

#### 相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1)医師の治療を受けている人。
  - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3)のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
  - (4)高齢者。
  - (5)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - (6)次の症状のある人。むくみ
  - (7)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
その他	動悸、のぼせ、ほてり、口唇・舌のしびれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 【効能・効果】

体力虚弱で、汗が出、手足が冷えてこわばり、ときに尿量が少ないものの次の諸症：関節痛、神経痛

## 【用法・用量】

次の量を食前又は食間<sup>\*</sup>に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1包	3回
7才以上 15才未満	2/3包	
4才以上 7才未満	1/2包	
2才以上 4才未満	1/3包	
2才未満	1/4包	

〔※食間：「食事と食事の間」という意味で、食後2～3時間を指します。〕

## 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合のみ服用させてください。
- (3)本剤は水又はぬるま湯で服用してください。

## 【成 分】 (3包6.0g中)

桂枝加朮附湯エキス・・・・・・・・・・3.7g

ケイヒ・・・・・・・・・・	2.0g
シャクヤク・・・・・・・・	2.0g
タイソウ・・・・・・・・	2.0g
ショウキョウ・・・・・・・・	0.5g
カンゾウ・・・・・・・・	1.0g
ソウジュツ・・・・・・・・	2.0g
ブシ末・・・・・・・・	0.5g

より抽出。〕

添加物として乳糖、バレイショデンプン、ヒプロメロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、香料を含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
  - (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
  - (3)他の容器に入れかえないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
  - (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
  - (5)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。
- 本剤は天然物を原料としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。

## 問い合わせ先

- 1)お買い求めのお店
- 2)全薬工業お客様相談室  
住 所：〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15  
電 話：03 (3946) 3610  
受付時間：9:00～17:00 (土・日・祝祭日を除く)

発 売 元  
 **全薬工業株式会社**  
東京都文京区大塚5-6-15

製造販売元  
 **松浦薬業株式会社**  
名古屋市中区昭和区円上町24-21