

漢方薬

ワクナガ 桂枝茯苓丸料 エキス細粒

ケイシブクリョウガンリョウ

製品の特徴

桂枝茯苓丸は、漢方の原典と言われる「きんぎょりやく金匱要略」に記載されている漢方処方、比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、めまい、のぼせて足冷えなどがある場合の、生理不順、生理痛、更年期障害、打ち身、しもやけ、しみなどに用いられます。

ワクナガ 桂枝茯苓丸料 エキス細粒は、桂枝茯苓丸をエキス化し、服用しやすい細粒にした製品です。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

- 1カ月位服用しても症状がよくなる場合
- 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。

下痢

効能・効果

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴える次の諸症：

月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭重、打ち身（打撲症）、しもやけ、しみ

用法・用量

1 回下記量を食前又は食間に水又はお湯と一緒に服用して下さい。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人 (15才以上)	1 包	3 回
7 才以上 15 才未満	2/3 包	
4 才以上 7 才未満	1/2 包	
4 才未満	服用させないで下さい	

食間とは、「食事と食事の間」という意味です。食事のあと 2 時間くらいたったところで服用して下さい。

<用法・用量に関する注意>

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分・分量 (3 包 (6.0g) 中)

桂枝茯苓丸料水製エキス (1/2 量)2.75g

ケイヒ.....2.0g	ブクリョウ.....2.0g
ポタンピ.....2.0g	トウニン.....2.0g
シャクヤク.....2.0g	

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、香料、メタケイ酸アルミン酸Mg、ヒドロキシプロピルメチルセルロースを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1 包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2 日以内に服用して下さい。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
- (6) 本剤は、生薬を用いた製剤ですから、製品により色が多少異なることがあります。が、効果に変わりはありません。

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 東京支社 お客様相談室

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2 丁目 5-1

(03) 3293-3363 (ダイヤルイン)

(月～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00 但し祝日を除く)



製造販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立 1624

本社：大阪市淀川区宮原 4 丁目 5-36

http://www.wakunaga.co.jp/