

漢方製剤

神農柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
(5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記のような重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
軟便、下痢
4. 1ヵ月位（小児夜泣き、便秘に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効 能〕

体力中等度以上で、精神不安があって、動悸、不眠、便秘などを伴う次の諸症：高血圧の随伴症状（動悸、不安、不眠）、神経症、更年期神経症、小児夜泣き、便秘

〔用法・用量〕

次の量を食前又は食間に水又はお湯にて服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人（15 才以上）	4 錠	3 回
7 才以上 15 才未満	3 錠	
5 才以上 7 才未満	2 錠	
5 才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- （1）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- （2）食間とは食後 2～3 時間を指します。

〔成分・分量〕

1 2 錠中

柴胡加竜骨牡蛎湯乾燥エキス 2.05 g を含有しています。

日局サイコ・・・2.5 g	日局ハンゲ・・・2.0 g	日局ブクリョウ・・・1.5 g
日局ケイヒ・・・1.5 g	日局オウゴン・・・1.25 g	日局タイソウ・・・1.25 g
日局ショウキョウ・・・0.4 g	日局ニンジン・・・1.25 g	日局リュウコツ・・・1.25 g
日局ボレイ・・・1.25 g	日局ダイオウ・・・0.5 g	

上記生薬量に相当します

添加物として、無水ケイ酸、ケイ酸A 1、CMC-C a、トウモロコシデンプン、ステアリン酸M g、乳糖水和物を含有しています。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- （2）小児の手の届かない所に保管してください。
- （3）他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- （4）吸湿しやすいため、服用のつどビンのフタをよくしめてください。
- （5）本剤は生薬（薬用の草根木皮等）を原料として使用していますので、製品により色調等が異なることがあります。効能には変わりありません。
- （6）本剤をぬれた手で扱わないでください。水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じることがあります。
- （7）使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記にお願いいたします。

神農製薬 お客様相談室

電 話 045 (593) 5738

受付時間 9:00～17:00

（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

製造販売元 **神農製薬株式会社**

〒321-3325 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台 196-1