

※※2009年9月改訂

※2007年5月改訂

漢方製剤

第2類医薬品

服用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

ツムラの漢方製剤

ツムラ漢方柴胡桂枝湯エキス錠A

『ツムラ漢方柴胡桂枝湯エキス錠A』は、漢方処方である「柴胡桂枝湯」から抽出したエキスより製した服用しやすい錠剤です。

こんな症状に効果があります

- ・かぜの中期から後期(かぜをひき始めてから数日たっても治りきらずに、頭痛・微熱・はき気がある)。
- ・腹痛があり、食欲がなく、胸がつかえるような胃腸炎。

⚠️ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (3) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
そ の 他	頻尿、排尿痛、血尿、残尿感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

*** (2) 1ヵ月位(かぜの中期から後期の症状の場合には1週間位)服用しても症状がよくなる場合。

※※● 効能・効果

体力中等度又はやや虚弱で、多くは腹痛を伴い、ときに微熱・寒気・頭痛・はきけなどのあるものの次の諸症：

胃腸炎、かぜの中期から後期の症状

●用法・用量

次の量を、食前または食間に水またはお湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	4錠	3回
7歳以上15歳未満	3錠	
5歳以上 7歳未満	2錠	
5歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

●成分・分量

本品12錠中、下記の割合の混合生薬の乾燥エキス2.7gを含有します。

日局サイコ……………2.5g	日局タイソウ……………1.0g
日局ハンゲ……………2.0g	日局ニンジン……………1.0g
日局オウゴン……………1.0g	日局カンゾウ……………0.5g
日局ケイヒ……………1.0g	日局ショウキョウ……………0.5g
日局シャクヤク……………1.0g	

添加物として日局カルメロース、日局軽質無水ケイ酸、日局ステアリン酸マグネシウム、日局炭酸水素ナトリウム、ショ糖脂肪酸エステルを含有します。

●保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 本剤をぬれた手で扱わないでください。ぬれた手で扱うと、錠剤の色や形が変わることがあります。
4. ビンの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損することを防止するために入れてありますので、キャップを開けた後はすててください。
5. ビンのキャップの締め方が不十分な場合、湿気等の影響で錠剤が変質することがありますので、服用のつどキャップをよく締めてください。
6. 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
7. 本剤は生薬（薬用の草根木皮等）を用いた製品ですので、製品により多少錠剤の色調が異なることや錠剤に斑点がみられることがありますが、効能・効果には変わりありません。
8. 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

お問い合わせ先

本製品内容について、何かお気付きの点がございましたら、お買求めのお店または下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

製造販売元 ※



お客様相談窓口
電話 0120-329-930
受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)
<http://www.tsumura.co.jp/>