

この添付文書は本剤とともに保管し、ご使用の際にはよくお読みください。

痔疾用外用薬 紫雲膏坐剤M

第2類医薬品

痔は、肛門周囲の静脈の血行が悪くなるために起こる疾患です。いぼ痔、きれ痔、さけ痔などがあり、いずれも肛門部の痛み、出血、はれ、かゆみなどを伴います。

本剤は、昔から漢方の外用薬として広く用いられている「紫雲膏」を成分としたソフトカプセルの坐剤です。痔疾の不快な症状にすぐれた効果を発揮します。

〔特 長〕

1. 痛み、出血、はれ、かゆみなど痔に伴う諸症状にすぐれた効果をあらわします。
2. 昔から外用剤として用いられている漢方薬の「紫雲膏」をソフトカプセルにしたものです。
3. 小型で挿入しやすく、短時間で薬効成分が溶出しますので、高濃度の紫雲膏を患部に接触させることができます。
4. ソフトカプセルを使用しておりますので、室温で保存ができます。



〔使用上の注意〕



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3)本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
その他	はれ、刺激感

- (2)10日間位使用しても症状がよくなる場合

〔効能・効果〕

次の場合の症状の緩和：いぼ痔、さけ痔、きれ痔、はれ痔、かゆ痔

〔成分・分量〕

本品1日量(2カプセル)中

紫雲膏……………1,600mg

トウキ(当帰)…133mg	ミツロウ……507mg
シコン(紫根)…133mg	ゴマ油……1,333mg
豚 脂……………33mg	より製した紫雲膏

添加物：ゴマ油、カプセル削皮に、ゼラチン、濃グリセリン、D-マンニトール、ハードファット、サラシミツロウを含有します。

〔用法・用量〕


次の量を1日2回(朝、夜)、排便後または就寝前に肛門内に挿入してください。

年 齢	成人(15才以上)	15才未満
1回量	1個	使用しないこと

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)小児には使用させないでください。
- (2)肛門にのみ使用してください。

〔坐剤の挿入法及び注意〕



左図の様に坐剤の太い方を先にして、細い方の底部に人差指をあて肛門内に挿入してください。
挿入しにくい場合は、坐剤を手の中で温めたり、坐剤にベビーオイル等を塗るなどすると、滑らかに挿入できます。

注 意：

- 本剤により、まれに下着に着色することがあります。念のためパッドなどを使用してください。もし、下着に色がついた場合、洗濯後日光にさらして頂ければ色は消えます。
- 本剤は肛門に挿入しやすいようソフトカプセルの表面にコーティングが施してありますので、表面に白い粉がついた様に見えることがあります。
また、冷所(冷蔵庫など)に保管しますとソフトカプセルに充填した紫雲膏軟膏剤の収縮によりすきまが生じ、その部分が白く見えたり、時としてまだら模様になることがあります。変質・カビ等によるものではありませんので安心して使用してください。

〔痔を早く治すには〕

痔を治療し再発を予防するには、便秘や下痢を避けるとともに局所を清潔に保つなど、日常の心がけが大切です。

- なるべく繊維質の多い野菜、海藻類を食べ、刺激物(唐辛子等)、アルコール類をひかえめにしてください。
- 毎日規則正しい排便を心がけてください。
- 毎日の入浴、排便後の洗浄などにより、肛門部を常に清潔に保ってください。
- 長時間座ったり、かがんだりすると、肛門部をうっ血させ、症状を悪化させますので、時々軽い体操などをして血液の循環をよくしてください。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わるため。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

〔お問い合わせ先〕

発売元 松浦漢方株式会社 薬事学術部
TEL (052)883-5131 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝日を除く)

発売元

松浦漢方株式会社
名古屋市中区上町24-21

製造販売元

 **松浦薬業株式会社**
名古屋市中区大高町寅新田36