

第2類医薬品


この添付文書は必要な時に読めるように大切に保管し、服用の際には必ずお読みください。

漢方製剤
 **JPS 漢方顆粒-21号**

小建中湯は体力がなく、疲れやすく、腹痛や冷え、ねあせがある方の疲労倦怠、慢性胃腸炎、小児夜尿症などを改善します。腹部の緊張をゆるめて痛みを鎮め、体力を補う働きがあります。

本剤は漢方処方である小建中湯の生薬を抽出し、乾燥エキスとした後、服用しやすい顆粒剤としました。

 **使用上の注意**

 **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)
 次の人は服用しないでください
 生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 悪心・嘔吐のある人。
- (4) 高齢者。
- (5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。

むくみ

- (7) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師または薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師または薬剤師に相談してください

〔成分・分量〕

3包(8.7g)中

小建中湯乾燥エキス8.0gを含有しています。

日局ケ イ ヒ …… 2.0 g	日局ショウキョウ …… 0.5 g
日局タ イ ソ ウ …… 2.0 g	日局シャクヤク …… 3.0 g
日局カ ン ゾ ウ …… 1.0 g	マルツエキス …… 10 g

上記生薬量に相当します

添加物として、ケイ酸Al、ステアリン酸Mg、乳糖水和物を含有しています。

〔効能・効果〕

体力虚弱で、疲労しやすく腹痛があり、血色がすぐれず、ときに動悸、手足のほてり、冷え、ねあせ、鼻血、頻尿および多尿などを伴うものの次の諸症：小児虚弱体質、疲労倦怠、慢性胃腸炎、腹痛、神経質、小児夜尿症、夜泣き

〔用法・用量〕

次の量を食前又は食間に水又はお湯にて服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人 (15才以上)	1 包	3 回
7才以上15才未満	2/3包	
4才以上7才未満	1/2包	
2才以上4才未満	1/3包	
2才未満	1/4包	

「食間とは…」

食後2～3時間を指します。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は吸湿しやすいので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返してテープ等で封をし、なるべく1日以内に服用してください。(開封状態で置いておくと顆粒が変色することがあります。変色した場合は、服用しないでください。)
- (5)本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を用いた製品ですので、製品により色調等が異なる場合がありますが、効能・効果には変わりありません。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記にお願いいたします。

ジェーピーエス製薬 お客様相談室

電 話 045(593)2136

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)



ジェーピーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1

本 社 横浜市都筑区東山田4-42-22