

服用に際して、この添付文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるように大切に保存して下さい。

第2類  
医薬品

# シンワの小建中湯飴

(小建中湯製剤)



## 【使用上の注意】



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 吐き気・嘔吐のある人。
  - 高齢者。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。
    - むくみ
  - 次の診断を受けた人。
    - 高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

### 【成分・分量】本品1日量(6粒)中

コウイ …………… 10000mg

桂枝加芍薬湯乾燥エキス …………… 1500mg

〔桂枝加芍薬湯乾燥エキス1500mgの内容〕

「日局」ケ イ ヒ …… 2.0g 「日局」ショウキョウ …… 0.5g

「日局」シャクヤク …… 3.0g 「日局」カンゾウ …… 1.0g

「日局」タイソウ …… 2.0g

添加物として白糖、グリセリン脂肪酸エステルを含有する。

**【効能・効果】** 体質虚弱で疲労しやすく、血色がすぐれず、腹痛、動悸、手足のほてり、冷え、頻尿および多尿などいずれかを伴う次の諸症:小児虚弱体質、疲労倦怠、神経質、慢性胃腸炎、小児夜尿症、夜なき

**【用法・用量】** 食間あるいは空腹時に1粒ずつを口中に含み、かみ砕くか溶かして用いて下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)及び 7歳以上の小児	2粒	3回
4歳以上7歳未満の小児	1粒	3回
4歳未満の乳幼児	服用しないで下さい	

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守して下さい。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- 4歳以上の小児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意して下さい。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- スティック包装開封後はすみやかに服用して下さい。
- 使用期限は外箱に記載してあります。期限を過ぎたものは服用しないで下さい。
- 本剤は天然物を原料としているため、色調、味又は香り等に多少の差異が出る場合がありますが、効果には変わりありませんので安心して服用して下さい。

\*【お問い合わせ先】 伸和製薬株式会社 情報管理室  
〒116-0003 東京都荒川区南千住5丁目17番8号  
電 話：03(3807)3780  
受付時間：9時から17時まで(土・日曜、祝日を除く)

\* 発 売 元 **伸和製薬株式会社**

東京都荒川区南千住5丁目17番8号



製造販売元 **高市製薬株式会社**

奈良県高市郡明日香村野口10