

第2類医薬品

この添付文書は必要な時に読めるように大切に保管し、服用の際には必ずお読みください。



漢方製剤 JPS 消風散料エキス錠N

消風散は比較的体力があり、かゆみが強く、ときに局所の熱感がある方の湿疹・皮膚炎、じんましん、あせもなどを改善します。かゆみを抑え、分泌物を改善する働きがあります。本剤は漢方処方である消風散の生薬を抽出し、乾燥エキスとした後、服用しやすい錠剤としました。

使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
5. 本剤の服用により、まれに症状が進行することもありますので、このような場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

[効能・効果]

体力中等度以上の人の皮膚疾患で、かゆみが強く分泌物が多く、ときに局所の熱感があるものの次の諸症：湿疹・皮膚炎、じんましん、水虫、あせも

〔用法・用量〕

次の量を食前又は食間に水又はお湯にて服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成人（15才以上）	4 錠	3 回
7 才以上15才未満	3 錠	
5 才以上 7 才未満	2 錠	
5 才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)食間とは食後2～3時間を指します。

〔成分・分量〕

12錠中

消風散料乾燥エキス2.35gを含有しています。

日局ト ウ キ …… 1.50 g	日局ジ オ ウ …… 1.50 g
日局セ ッ コ ウ …… 1.50 g	日局ボ ウ フ ウ …… 1.00 g
日局ソウジュツ …… 1.00 g	日局モ ク ツ ウ …… 1.00 g
日局ゴ ボ ウ シ …… 1.00 g	日局チ モ …… 0.75 g
日局ゴ マ …… 0.75 g	セ ン タイ …… 0.50 g
日局ク ジ ン …… 0.50 g	日局ケ イ ガ イ …… 0.50 g
日局カンゾウ …… 0.50 g	

上記生薬量に相当します

添加物として、無水ケイ酸、ケイ酸Al、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、トウモロコシデンプンを含有しています。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)吸湿しやすいため、服用のつどビンのフタをよくしめてください。
- (5)本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を原料として使用していますので、製品により色調等が異なることがありますが、効能・効果にはわかりありません。
- (6)本剤をぬれた手で扱わないでください。水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じることがあります。
- (7)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記にお願いいたします。
ジェーピーエス製薬 お客様相談室
電 話 045(593)2136
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



ジェーピーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1
発 売 元 横浜市都筑区東山田4-42-22