

2013年1月作成

服用に際し、この説明書を必ず読むこと。また、必要なとき読めるように大切に保管すること。

当帰芍薬散料NP

第2類医薬品

トウ キ シャク ヤク サン リョウ
当 帰 芍 薬 散 料 NP

 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 胃腸の弱い人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

| 関係部位 | 症状 |
|------|------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 食欲不振、胃部不快感 |

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

効能効果

体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り。

用法用量

| 年 令 | 1 日 量 |
|------------|---|
| 大人（15才以上） | 本品1包（1日量）に水約600mLを加えて、半量ぐらいまで煎じつめ、煎じかすを除き、煎液を3回に分けて食間に服用する。 |
| 7才以上 15才未満 | 大人の煎液の2／3量 |
| 4才以上 7才未満 | 大人の煎液の1／2量 |
| 4才未満 | 服用しないこと |

〈用法用量に関連する注意〉

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

裏面に続く

成分分量

本品1包(1日量)中

| 成分 | 分量 |
|--------|-----|
| トウキ | 3g |
| センキュウ | 3g |
| シャクヤク | 6g |
| ブクリョウ | 4g |
| ビャクジュツ | 4g |
| タクシャ | 4g |
| 全量 | 24g |


保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管すること。
2. 小児の手のとどかないところに保管すること。
3. 外袋は、ミシン目にそってハサミ等で開けること。
4. 未使用分はもとの袋にもどし、開封口をきちんと二重に折り曲げてテープ等でとめて冷暗所に保管すること。
5. 他の容器に入れかえないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
6. 生薬を原料にしているため、製品により多少色調やにおいが異なることがあります。薬効に変わりありません。
7. 外袋には、防虫・防カビのために脱酸素剤を封入していますが、これを煎じ袋と一緒に煎じたり、食べたりしないように注意すること。
8. 煎じ袋は破かずに、そのまま煎じること。
9. 本品を煎じるときは、熱湯に注意すること。
10. 本品は、必ず一日分ずつ煎じ、数日分まとめて煎じないこと。
11. 表示の使用期限を過ぎたものは服用しないこと。

【問い合わせ先】

1. 購入した薬局・薬店
2. 日水製薬株式会社 お客様相談窓口 電話：03-3837-0987
受付時間：午前10時～12時、午後1時～5時
(土・日・祝日を除く)

製造販売元

 日水製薬株式会社

東京都台東区上野3-23-9

副作用被害救済制度の問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html> ☎0120-149-931