

薬事法改正に伴う改訂
2005年4月

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

排膿散料

(はいのうさんりょう)

第2類医薬品

本剤は、漢方の古典「金匱要略」に記載されている排膿散に準拠して製造された煎薬用の紙パック剤です。



相談すること



— 使用上の注意 —

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
消化器	胃部不快感

(2) 5～6日間服用しても症状の改善がみられない場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。

【効能・効果】

化膿性皮膚疾患の軽いもの。

【用法・用量】

1包(1日量)につき水400mLを加え、あまり強くない火にかけ200mLに煮つめ、紙袋とともにかすを取り去り、食前1時間前又は食間空腹時に温服して下さい。

年齢	1包(1日量) 煎じ液	1日 服用回数	年齢	1包(1日量) 煎じ液	1日 服用回数
大人(15才以上)	全量	3～2回 に分けて	15才未満7才以上	2/3量	3回に 分けて
			7才未満4才以上	1/2量	

＜用法及び用量に関連する注意＞

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】 [本品1包(1日量) 12.0g中]

- 日本薬局方 キジツ…5.0g
- 日本薬局方 シャクヤク…5.0g
- 日本薬局方 キキョウ…2.0g


【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- (4) 煎じ薬は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用すること。

【問い合わせ先】

東洋漢方製薬株式会社 フリーダイヤル 0120-00-1040
受付時間 10:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元

 東洋漢方製薬株式会社

大阪府富田林市中野町東2-1-16