

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

全薬養生漢方[®]

ほういおうぎとう

防已黄耆湯エキス〔細粒〕56 <漢方製剤>

第2類医薬品

防已黄耆湯エキス〔細粒〕56は、

1. 肥満症(水ぶとり)やむくみを改善する漢方薬です。
2. サラツとして服用しやすい淡褐色の細粒剤です。

【使用上の注意】



してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものの次の諸症：

肥満症（筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり）、むくみ、肥満に伴う関節の腫れや痛み、多汗症

【用法・用量】

次の量を食前又は食間※に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1包	3回
7才以上 15才未満	2/3包	
4才以上 7才未満	1/2包	
2才以上 4才未満	1/3包	
2才未満	1/4包	

〔※食間：「食事と食事の間」という意味で、食後2～3時間を指します。〕

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。
- (3)本剤は水又はぬるま湯で服用してください。

【成 分】（3包6.0g中）

防已黄耆湯エキス(1/2量)・・・3.4g

ボウイ	2.5g
オウギ	2.5g
ビャクジュツ	1.5g
ショウキョウ	0.5g
タイソウ	1.5g
カンゾウ	0.75g

より抽出。〕

添加物としてトウモロコシデンプン、乳糖、ヒプロメロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、香料を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

○本剤は天然物を原料としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。

問い合わせ先

- 1)お買い求めのお店
- 2)全薬工業お客様相談室
住 所：〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15
電 話：03 (3946) 3610
受付時間：9:00～17:00（土・日・祝祭日を除く）



発 売 元
全薬工業株式会社
東京都文京区大塚5-6-15



製造販売元
松浦薬業株式会社
名古屋市中昭和区円上町24-21