

漢方薬 薬日本堂 防風通聖散 エキス錠

特 徴

- 「薬日本堂防風通聖散エキス錠」は、漢方処方「防風通聖散」(ぼうふうつうしょうさん)のエキスを製剤化した漢方製剤です。
- 腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちな方の肥満症、便秘、むくみ及び高血圧に伴うどうき、肩こり、のぼせに効果があります。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
(5) 発汗傾向の著しい人。
(6) 高齢者。
(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
(8) 次の症状のある人。 むくみ、排尿困難
(9) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹部膨満、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
精神神経系	めまい
そ の 他	発汗、動悸、むくみ、頭痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢、便秘
4. 1ヵ月位(便秘に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなもの
の次の諸症：

高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・
便秘、蓄膿症（副鼻腔炎）、湿疹・皮膚炎、ふきでも
の（にきび）、肥満症



用法・用量

次の量を食前又は食間に、水またはお湯でかまずに服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	5錠	3回
7歳以上15歳未満	3錠	
5歳以上7歳未満	2錠	
5歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

15錠(成人の1日服用量)中、次の成分及び分量からなる防風通聖散工
ス末2.03gを含んでいます。

成分	分量	成分	分量
トウキ(当帰)	0.80 g	マオウ(麻黄)	0.80 g
シャクヤク(芍薬)	0.80 g	ダイオウ(大黄)	1.00 g
センキュウ(川芎)	0.80 g	硫酸ナトリウム	1.00 g
サンシシ(山梔子)	0.80 g	ビャクジュツ(白朮)	1.33 g
レンギョウ(連翹)	0.80 g	キキョウ(桔梗)	1.33 g
ハッカ(薄荷)	0.80 g	オウゴン(黄芩)	1.33 g
ショウキョウ(生姜)	0.27 g	カンゾウ(甘草)	1.33 g
ケイガイ(荊芥)	0.80 g	セッコウ(石膏)	1.33 g
ボウフウ(防風)	0.80 g	カッセキ(滑石)	2.00 g

添加物として乳糖、バレイシヨデンブン、カルメロースCa、ステアリン酸Mgを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。
- (4) 吸湿しやすいため、服用後はキャップをしっかりと閉めてください。



その他の注意

- (1) 天然原料を用いていますので、色調・匂いが製品により多少異なること
がありますが、効果に変わりはありません。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

薬日本堂株式会社

電話：03(3446)2011(代表) 受付時間：10：00～18：00(土日・祝日を除く)

発売元 **薬日本堂株式会社**

東京都品川区北品川4-7-35
www.nihondo.co.jp

製造販売元 **大草薬品株式会社**

神奈川県横須賀市森崎1-17-15