

漢方製剤

第2類医薬品

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また必要ときに読めるよう、大切に保管してください。

ボーツステージG

「ボーツステージG」は、中国の医書「宣明論」に記載されている代表的な漢方処方「防風通聖散」に基づく漢方製剤です。腹部に脂肪の多い人、便秘がちの人に適しています。

⚠️ [使用上の注意]

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬(下剤)。
2. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹部膨満、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
精神神経系	めまい
その他	発汗、動悸、むくみ、頭痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢、便秘

4. 1ヶ月位(便秘に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能又は効果】

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちな方の次の諸症：
高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症(副鼻腔炎)、湿疹・皮膚炎、ふきでもの(にきび)、肥満症

【用法及び用量】

下記の分量を1日3回食前または食間に、水または白湯で服用してください。

成人(15歳以上)	1回4錠	15歳未満7歳以上	1回3錠
7歳未満5歳以上	1回2錠	5歳未満は服用しないこと	

※食間とは食後約2時間のことをいいます。

<用法及び用量に関する注意>

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分及び分量】 1日量(12錠)中

防風通聖散剤エキス……………3300mg

<原生薬換算量>

トウキ……………0.72g	マオウ……………0.72g
シャクヤク……………0.72g	ダイオウ……………0.9g
センキュウ……………0.72g	乾燥硫酸ナトリウム……………0.45g
サンシシ……………0.72g	ビャクジュツ……………1.2g
レンギョウ……………0.72g	キキョウ……………1.2g
ハツカ……………0.72g	オウゴン……………1.2g
ショウキョウ……………0.24g	カンゾウ……………1.2g
ケイガイ……………0.72g	セッコウ……………1.2g
ポウフウ……………0.72g	カッセキ……………1.8g

添加物として、無水ケイ酸、タルク、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、カルナウバロウを含む。

【保管および取扱い上の注意】

- (1) 直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に、キャップをきちんと閉めて外箱に入れて保管すること。
- (2) お子様の手の届かない所に保管すること。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないこと。
- (4) ビンの中の詰物は、錠剤の破損を防ぐために入れてありますので、開栓後は捨ててください。
- (5) この文書は、本剤の使用の際に必要な注意事項などが記載されていますので、ビンと一緒に外箱に入れて保管すること。
- (6) 表示の期限を過ぎた製品は、服用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く使用してください。

【その他】

本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、錠剤の色が多少異なることや、開栓後に吸湿した場合は錠剤の色が濃くなる場合がありますが、効果には変わりありません。

本製品についてのお問い合わせはお買上のお店又は、下記までお願い申し上げます。
 中村薬品工業株式会社 お客様相談窓口
 〒635-0121 奈良県高市郡高取町大字丹生谷31-32
 電話 0745-67-0038 FAX 0745-67-1438
 受付時間 10:00~16:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

中村薬品工業株式会社

(裏面につづきます)