

抑肝散加陳皮半夏エキス[細粒]92

抑肝散の名は、肝気の興奮を抑え鎮静させる効能に基づいてつけられたものです。本方は、四逆散の変方で、虚弱な体質の人で神経の高ぶる人に用い、また、かんの強い小児にも奏効します。

⚠️ • 使用上の注意 •

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 胃腸の弱い人
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

(2) 1ヵ月位（小児夜なきに服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合

● 成分・分量 ●

本品3包(6.0g)は

トウキ	1.5g	サイコ	1.0g
チョウトウコウ	1.5g	カンゾウ	0.75g
センキュウ	1.5g	チンピ	1.5g
ビャクジュツ	2.0g	ハンゲ	2.5g
ブクリョウ	2.0g		

抑肝散加陳皮半夏エキス5.8gを含有する細粒剤です。添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、ヒプロメロース、デキストリン、乳糖水和物、トウモロコシデンプン、香料を含有します。

● 効能・効果 ●

虚弱な体質で神経がたかぶるものの次の諸症；

神経症、不眠症、小児夜なき、小児疳症

● 用法・用量 ●

次の量を1日3回、食前又は食間に服用してください。

(食間とは食後2～3時間を指します。)

年 齢	1回量
大人(15才以上)	1包
15才未満7才以上	2/3包
7才未満4才以上	1/2包
4才未満2才以上	1/3包
2才未満	1/4包

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

● 保管及び取扱い上の注意 ●

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わるため。)
- (4) 本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。
- (5) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願い申し上げます。
発売元：天野商事株式会社 消費者相談室 名古屋市中区丸の内三丁目13番12号
電話：(052)951-2340
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日及び弊社休業日を除く)



発売元

天野商事株式会社

〒460-0002

名古屋市中区丸の内三丁目13番12号



製造販売元

松浦薬業株式会社

〒459-8001

名古屋市緑区大高町寅新田36

TEL052-621-3291