

この添付文書は本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

漢方製剤

第2類医薬品

温快泉 (細粒)

本方は、当帰芍薬散、四物湯と並ぶ補血剤ですが、手のひらや足の裏のほてりや唇の乾きといった症状がみられる人の足腰の冷え、神経症、しもやけ、手あれ（手の湿疹・皮膚炎）等に用います。

⚠️ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 胃腸の弱い人
- (4) 高齢者
- (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (6) 次の症状のある人　むくみ
- (7) 次の診断を受けた人　高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

1206A

(裏面につづく)

漢方製剤

第2類医薬品

温快泉 (細粒)

●効能・効果●

体力中等度以下で、手足がほてり、唇がかわくものの次の諸症：
足腰の冷え、神経症、しもやけ、手あれ（手の湿疹・皮膚炎）、
更年期障害、湿疹・皮膚炎、不眠、月経不順、月経困難、こし
け（おりもの）

●用法・用量●

次の量を食前又は食間に水又は温湯で服用してください。
（食間とは食後2～3時間を指します。）

年 齢	1 回 量	1日服用回数
	分包剤	
大人(15才以上)	1 包	3 回
15才未満7才以上	2/3包	
7才未満4才以上	1/2包	
4才未満2才以上	1/3包	
2才未満	1/4包	

【用法・用量に関連する注意】

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

●成分・分量●

本品3包(6.0g)は

ハンゲ	2.0g	ケイヒ	1.0g
バクモンドウ	2.0g	ポタンピ	1.0g
トウキ	1.5g	ショウキョウ	0.33g
センキュウ	1.0g	カンゾウ	1.0g
シャクヤク	1.0g	ゴシュユ	0.5g
ニンジン	1.0g		


上記より製した生薬水製エキス5.5g

ゼラチン1.0g

を含有する細粒剤です。添加物としてメタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ヒプロメロース、乳糖水和物、トウモロコシデンプン、香料を含有します。

●保管及び取扱い上の注意●

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）
- (4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがありますが、効果には変わりありません。
- (5)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

発売元  日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-36-16

本剤について
のお問合せ先 お客先相談室 TEL 0744-52-3720
月～金曜日 10:00～18:00（土・日・祭日を除く）

製造販売元 州田薬品工業株式会社
奈良県高市郡高取町市電986

副作用報告義務制度 TEL 0120-149-931