

日本薬局方 トウガラシチンキ

トウガラシチンキFM

CAPSICUM TINCTURE

17L

禁忌(次の部位には使用しないこと)
びらん、創傷皮膚及び粘膜

■組成・性状

販 売 名	トウガラシチンキFM
有 効 成 分	100mL中、日局トウガラシ 10g をエタノールで抽出した成分を含有
性 状	黄赤色の液で、味はやくように辛い
比 重	d ₂₀ ²⁰ : 約0.82

■効能・効果 ■用法・用量

皮膚刺激剤として下記に用いる

効能・効果	用法・用量
筋肉痛、凍瘡、凍傷(第1度)	本剤を通常、10～40%を添加した液剤、軟膏剤、硬膏剤又はパップ剤を1日1～数回局所に塗布する。
育毛	本剤を通常、1～4%を添加した液剤を1日1～数回局所に塗擦する。

製造販売元

株式会社 **フジミ製薬所**
大阪市東成区中本2丁目9番9号

2014年6月作成(第1版)

日本標準商品分類番号	872649
承認番号	16100AMZ00604
薬価収載	1986年1月
販売開始	1986年10月

貯 法: 密栓し、室温、遮光保存、火気を避けて保存
使用期限: 3年(ラベル右下に表示)

■使用上の注意

1. 副作用

本剤は、副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類\頻度	頻度不明
皮 膚 ^(注)	刺激感、疼痛等

注)このような症状が強く現れた場合には濃度を下げるなど適切な処置を行うこと。

2. 適用上の注意

- 1) 原液のまま使用しないこと。
- 2) 入浴直後に使用しないよう注意させること。
- 3) 眼又は眼の周囲に使用しないこと。

火気厳禁

アルコール類
水 溶 性
危険等級 II

缶・キャップ
中 栓: PE
注ぎ口: PE

(01) 04987732170200

製造番号 14M01

(01) 14987732170207

使用期限 2017. 07